

SECONDA NIDIFICAZIONE DI CIVETTA, *ATHENE NOCTUA*, IN CORSICA

ABSTRACT. — Second breeding of Little Owl, *Athene noctua*, in Corsica.

La Civetta (*Athene noctua*) è uno Strigiforme sedentario che trova la sua distribuzione nel Palearctico, soprattutto al di sotto del 60° N, favorita nei secoli scorsi dalla graduale sostituzione delle foreste planiziali con ecosistemi rurali di origine antropica (EXO, 1992). Tuttavia la Civetta ha subito recentemente un significativo regresso demografico, a seguito di marcate modificazioni ambientali ed all'uso di prodotti chimici nelle moderne tecniche agricole.

Il declino della specie è stato evidenziato (TUCKER & HEATH, 1994) in diverse aree continentali, mentre la distribuzione nelle isole del bacino del Mediterraneo risulta singolare e disomogenea. La Civetta assente dalle Baleari (CRAMP, 1997) è ben distribuita in Sicilia ed in Sardegna e persino sulla piccola isola de La Maddalena (MESCHINI & FRUGIS, 1993).

In Corsica, fu definita "Non Rara e sedentaria" da GIGLIOLI (1890), ma THIBAUT (1983) verificò una distribuzione (recente e storica) particolarmente scarsa e frammentaria e pur evidenziando la possibilità teorica di qualche sporadica nidificazione, per questo secolo rimane nota una sola nidificazione accertata (THIOLLAY, 1966), nei pressi dell'Etang Del Sale (comune di Aleria).

Lo status demografico della Civetta in Corsica si allinea alla distribuzione scarsa rilevata nell'isola di Creta (THIBAUT & BONACCORSI, 1999); nel tentativo di spiegare l'eclatante rarefazione della specie, THIBAUT (1983) e BONACCORSI (1994) hanno ipotizzato una competizione trofica e territoriale con l'Assiolo, *Otus scops*, che avrebbe favorito quest'ultimo.

Nel 1995, a seguito di indagini ornitologiche condotte per 4 anni, durante il periodo primaverile-estivo, nella pianura orientale della Corsica, è stata localizzata nei pressi di Aleria a seguito di uscite con nastri registrati, la presenza territoriale di una Civetta.

La tipologia ambientale riscontrata nell'area di studio (pianura centro orientale della Corsica), vede prevalere vaste aree bonificate nel dopoguerra e riconvertite ad uso agricolo, che hanno favorito l'espansione di prodotti agricoli tipici del mediterraneo (vite, ulivo, agrumi e frutta) e simultaneamente uno status ambientale idoneo alla presenza di questo predatore.

Nell'area considerata, alla periferia di Aleria, il 31-5-1998 (THIBAUT & BONACCORSI, 1999) è stata ricontattata una Civetta con il metodo del playback in ore crepuscolari, favorendo inoltre la localizzazione di alcuni posatoi preferenziali. Con successive e ripetute uscite nelle prime ore del mattino, è stato localizzato il nido, collocato nel sottotetto di un edificio rurale, localizzato a circa tre km dal mare ed a meno di un km dal fiume Tavignano. Sono stati avvistati 2 giovani (5-6-1998), che confermano la seconda nidificazione in questo secolo della Civetta nell'isola di Corsica. Dal punto di vista ambientale, il sito è risultato ubicato in un'area agreste integrata da numerosi incolti e l'abbondanza di ortotteri e imenotteri (trovati in qualche borra recuperata nei pressi del nido) ha certamente favorito l'approvvigionamento trofico durante la riproduzione.

Questa nidificazione ubicata nello stesso comprensorio della riproduzione storica del 1964, induce a considerare la pianura centro-orientale della Corsica il territorio a maggior vocazione dell'isola per la diffusione della Civetta.

Ringraziamenti. - Un sentito ringraziamento a Jean Claude Thibault e Gilles Faggio per le preziose informazioni, i suggerimenti, il materiale bibliografico inerente la fenologia della Civetta in Corsica.

BIBLIOGRAFIA

- BONACCORSI G., 1994 - Avifaune de la Basse Vallée de la Gravona - *Edit. A. Piazzola*.
 CRAMP S. (Ed.), 1985 - The Birds of Western Palearctic. CD ROM.